



MotherToBaby

Medicamentos y Más Durante el Embarazo y la Lactancia
Pregunte a los Expertos

Hoja Informativa

por la **Organización de Especialistas en Información de Teratología (OTIS)**.
Para más información de nuestros servicios o para encontrar servicios en su área,
llame al **(866) 626-6847**. Visítenos en la red en **www.MotherToBaby.org**.
¡Encuéntrenos! Facebook.com/MotherToBaby o @MotherToBaby en Twitter.

Ibuprofeno

Esta hoja habla sobre el riesgo que la exposición al ibuprofeno puede tener durante el embarazo. Con cada embarazo, todas las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con defectos congénitos. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de la salud.

¿Qué es el ibuprofeno?

El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroideos (AINE) utilizado comúnmente para tratar la artritis, dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre y cólicos menstruales. Otros nombres para el ibuprofeno incluyen: Motrin®, Advil® y Nuprin®. El ibuprofeno también es un ingrediente que se encuentra en muchas combinaciones de productos sin receta médica.

Yo tomo ibuprofeno regularmente en altas cantidades para mi condición médica. ¿Esto puede dificultar que me embarace?

Dos estudios menores han sugerido un aumento en el riesgo con el uso de los AINES como el ibuprofeno para un tipo de infertilidad temporal femenina de nombre síndrome de folículos no rotos. Esto ocurre cuando el folículo (la estructura en donde el huevo crece) no desprende el huevo en el momento de la ovulación, a pesar de ser, de otra manera, un ciclo normal. Este síndrome parece que ocurre con más probabilidades con el uso crónico de AINES. Se necesitan realizar más investigaciones para poder evaluar el riesgo del síndrome de folículos no rotos con el ibuprofeno. Como de costumbre, usted no debería dejar de tomar su medicamento sin antes haber consultado a su proveedor de la salud.

¿Es verdad que si tomo ibuprofeno al inicio del embarazo puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo?

Dos estudios han encontrado un aumento en el riesgo de abortos espontáneos con el uso de AINES a principios del embarazo; sin embargo, otros estudios no encontraron esta asociación. También hay ciertas preocupaciones que los fármacos como el ibuprofeno puedan interferir con la implantación del feto temprano. Mientras que no se ha establecido un riesgo claro, las mujeres quienes están tratando de concebir deberían de considerar evitar el ibuprofeno.

Me acabo de enterar que estoy embarazada y usé ibuprofeno la semana pasada para un dolor de cabeza. ¿Esto puede causar malformaciones congénitas a mi bebé?

Cuando se usa el ibuprofeno como indicado en el primer y segundo trimestre del embarazo, no se ha asociado con un aumento general en el riesgo de malformaciones congénitas en la población general según lo indican varios reportes. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que una asociación posible con el uso de AINES a principios del embarazo y un riesgo bajo de ciertas malformaciones congénitas.

Dos estudios han sugerido un pequeño aumento en el riesgo de gastroquisis (un defecto en el que los intestinos del infante se salen por un agujero de la pared abdominal) con el uso del ibuprofeno en el primer semestre. Estos estudios sugieren que el uso del ibuprofeno en el primer semestre aumenta el riesgo de tener a un bebé con gastroquisis de 1 en 10,000 a entre 1.6 y 4 en 10,000. Sin embargo, otros dos estudios más que analizaron los casos de gastroquisis no han apoyado esta asociación. Ya que la gastroquisis es una malformación congénita relativamente rara, el potencial aumento en el riesgo es muy bajo.

Un pequeño aumento en el riesgo de defectos cardíacos se ha reportado en tres estudios que analizan las prescripciones de AINES en la temprana etapa del embarazo. No obstante, la razón por la que el AINE fue prescrito no estuvo disponible en la mayoría de la información de los embarazos. Esta información es importante porque algunas enfermedades, como las infecciones virales, se han asociado con los defectos cardíacos.

A la fecha, no hay suficiente evidencia para saber si el ibuprofeno aumenta el riesgo de defectos cardíacos o gastroquiasis. Sin embargo, el ibuprofeno por lo general no es el analgésico más usado durante el embarazo ya que hay preocupaciones con el uso del ibuprofeno durante el tercer trimestre. Como con cualquier medicamento en el embarazo, sólo debería de tomarse si es necesario y con la aprobación de su proveedor de la salud.

Tengo siete meses de embarazo. ¿Puedo tomar ibuprofeno?

Hay cierta preocupación con el uso del ibuprofeno en el tercer trimestre. La preocupación mayor es el cierre prematuro del ductus arterioso (un vaso en el corazón del feto), el cual puede conllevar a presión arterial alta en los pulmones del feto (hipertensión pulmonar). El uso del ibuprofeno más tarde en el embarazo puede inhibir el trabajo de parto o causar una reducción del líquido amniótico (oligohidramnio). Por lo tanto, se recomienda que las mujeres sólo usen el ibuprofeno bajo la supervisión de un proveedor de la salud durante el tercer trimestre.

Necesito continuar tomando ibuprofeno regularmente durante mi embarazo por una condición médica. ¿Qué puedo esperar de este uso?

Los estudios no han encontrado un aumento general en el riesgo de malformaciones congénitas, bajo peso al nacer o trabajos de parto antes de término con el uso de AINES en el primer o segundo trimestre del embarazo. La preocupación en lo que se refiere al uso en el tercer semestre exige una vigilancia muy de cerca, y su médico puede ver el estado del corazón y el volumen del líquido amniótico de su bebé en el tercer trimestre por medio de un ultrasonido. Además, usted debería de estar con la dosis más baja que pueda tratar su condición de manera efectiva.

¿Puedo tomar ibuprofeno mientras amamanto?

La Academia Americana de Pediatría ha clasificado al ibuprofeno como aprobado para el uso de las madres durante la lactancia. El ibuprofeno entra a la leche materna en niveles muy bajos. Un estudio comunicó que bajo dosis normales, el infante amamantado estaría expuesto a menos de 1mg de ibuprofeno al día.

El padre de mi bebé estaba tomando ibuprofeno regularmente para dolores de espalda cuando me embaracé. ¿Afectará esto mi embarazo?

No hay evidencia que sugiera que el uso del padre de ibuprofeno cause infertilidad o malformaciones congénitas. Por lo general, la exposición del padre es muy poco probable que aumente los riesgos al embarazo. Para más información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby?Exposiciones Paternas y el Embarazo en <http://www.mothersbaby.org/files/paternal.pdf>.

Las Referencias Disponibles Bajo Solicitud.

agosto, 2015