



MotherToBaby

Medicamentos y Más Durante el Embarazo y la Lactancia  
Pregunte a los Expertos

# Hoja Informativa

por la **Organización de Especialistas en Información de Teratología (OTIS)**.  
Para más información de nuestros servicios o para encontrar servicios en su área,  
llame al **(866) 626-6847**. Visítenos en la red en **www.MotherToBaby.org**.  
¡Encuéntrenos! Facebook.com/MotherToBaby o @MotherToBaby en Twitter.

## Tofacitinib y el Embarazo

En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si exponerse a tofacitinib podría aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.

### ***¿Qué es tofacitinib?***

Tofacitinib es un medicamento de prescripción utilizado para tratar la artritis reumatoide moderada a severa. Tofacitinib se comercializa bajo la marca Xeljanz®. Xeljanz® es una píldora que se toma por vía oral, por lo general dos veces al día.

### ***¿Cuánto tiempo tofacitinib se queda en el cuerpo? ¿Debería dejar de tomarlo antes de tratar embarazarme?***

Cada persona metaboliza las medicinas de diferentes maneras. En promedio tarda solamente cerca de 3 horas por una mitad de la medicina para dejar el cuerpo. Esto significa que la mayor parte de la medicina se desaparece del organismo en un día.

No debe dejar de tomar ningún medicamento sin antes consultar con su proveedor de salud. Los beneficios de tomar tofacitinib y tratar su enfermedad autoinmune durante el embarazo deben sopesarse contra los posibles riesgos de continuar con el medicamento.

### ***¿El tomar tofacitinib podría ser más difícil quedar embarazada?***

Hasta el momento, no se han hecho estudios en la mujer para ver si hay algún efecto sobre la fertilidad humana.

### ***¿El tomar tofacitinib durante mi embarazo podría causar pérdida del embarazo o malformaciones congénitas?***

No se sabe si tofacitinib puede causar malformaciones congénitas. Los estudios en animales demostraron un aumento en malformaciones congénitas cuando las dosis utilizadas fueron muy grandes a las dosis usadas en humanos. Hay 29 reportes de mujeres expuestas a tofacitinib sobre todo durante el comienzo del embarazo. No se observó aumento en la pérdida del embarazo ni malformaciones congénitas. En este punto, no podemos estar seguros cual es el riesgo, o si hay algún riesgo, al usar tofacitinib durante el embarazo.

### ***¿Puedo tomar tofacitinib mientras estoy amamantando?***

Tofacitinib no ha sido estudiado para su uso durante la lactancia. Asegúrese de consultar a su proveedor de salud acerca de sus opciones para amamantar.

### ***¿Qué pasa si el padre del bebé toma tofacitinib?***

No se han realizado estudios para examinar posibles riesgos de un embarazo cuando el padre toma tofacitinib. En general, las exposiciones que tienen los padres es menos probable que aumente el riesgo para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones Paternas y el Embarazo en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/>.

*MotherToBaby actualmente está realizando un estudio en enfermedades autoinmunes y los medicamentos utilizados para tratar enfermedades autoinmunes en el embarazo. Si usted está interesado en participar en este estudio, por favor llame al 1-877-311-8972.*

**Referencias Seleccionadas:**

- Merren A, Chen Y, Frazier D, Geier J. 2015. Pregnancy Outcomes in the tofacitinib RA study database through April 2014. Abstract doi 10.1136/annrheumdis-2015-eular.3547.
- Xeljanz® Prescribing Information. Available online at <http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=959> accessed 26 April 2014.

julio, 2015