



MotherToBaby

Medicamentos y Más Durante el Embarazo y la Lactancia
Pregunte a los Expertos

Hoja Informativa

por la **Organización de Especialistas en Información de Teratología (OTIS)**.
Para más información de nuestros servicios o para encontrar servicios en su área,
llame al **(866) 626-6847**. Visítenos en la red en **www.MotherToBaby.org**.
¡Encuéntrenos! Facebook.com/MotherToBaby o @MotherToBaby en Twitter.

Vacuna Tdap (Difteria, Tétanos y Pertussis)

En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de posibilidades de tener un bebé con un defecto congénito. Esto se conoce como el riesgo de fondo. Esta hoja habla sobre si la exposición al tétanos, la difteria, la tos ferina, o Tdap puede aumentar el riesgo de defectos de nacimiento más que el riesgo de fondo. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico y consejo de su profesional de la salud.

¿Cuáles son el tétanos, la difteria y la tos ferina?

El tétanos es una enfermedad bacteriana. Esto causa el endurecimiento de los músculos y espasmos musculares dolorosos en el cuerpo. Incluso con una buena atención, el 10-20 % de las personas con tétanos mueren a causa de la enfermedad. Las bacterias que causan el tétanos se pueden encontrar en el suelo y los residuos animales. El tétanos se mete en el cuerpo de una persona a través de un corte abierto.

La difteria es una infección bacteriana que generalmente comienza con una fiebre y dolor de garganta. Una capa delgada (llamada membrana) puede formar sobre la parte posterior de la garganta y las vías respiratorias, dificultando la respiración. Sin tratamiento, la difteria es casi siempre mortal. El uso de vacunas de la no es común en los Estados Unidos, Canadá, y muchos otros países.

La tos ferina (también llamada tos ferina) es una enfermedad bacteriana que generalmente comienza con síntomas parecidos a los del resfriado común. Tos graves pueden aparecer después de varias semanas. Rápido, toses pesadas pueden causar un sonido ferino agudo al respirar.

La tos ferina es más grave en los bebés. En un brote en 2010 en California, 10 niños murieron. Es una enfermedad grave y la necesidad de atención hospitalaria pueden ocurrir en hasta el 5 % de los adolescentes y adultos que contraen la tos ferina.

¿En estas condiciones es contagiosa?

El tétanos no se pasa de persona en persona. La difteria y la tos ferina son contagiosas y se propagan a través del aire cuando una persona tose o estornuda. Si una persona no recibe una vacuna, hay 80% de probabilidades de que una persona que vive en un hogar con una persona infectada se capture la tos ferina.

¿Estas enfermedades causan problemas en el embarazo?

Tétanos y la difteria pueden ser mortales para la mujer embarazada y pueden resultar en la pérdida del bebé. Nacimiento antes de las 37 semanas de embarazo (parto prematuro) es también una preocupación. El tétanos puede ocurrir en los bebés en media de las madres que no tienen suficiente protección contra el tétanos para pasar al bebé recién nacido. El tétanos en el recién nacido es más común en los países en desarrollo, y puede ser mortal.

La tos ferina durante el embarazo no ha sido bien estudiada. No hubo complicaciones en el embarazo en una serie de 32 mujeres que habían tenido tos ferina al final del embarazo. Hay algunos informes de problemas para el bebé, pero no se sabe si esos problemas se debían a la tos ferina materna. Enfermedad grave podría ser un riesgo para la salud de la madre y el bebé.

¿Qué es la vacuna Tdap?

La vacuna Tdap protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina para adolescentes y adultos. Vacunación infantil contra estas enfermedades no proporciona protección de por vida. Las marcas de Tdap están Adacel® y Boostrix®.

La vacuna Tdap no es infecciosa, lo que significa que no se puede obtener las enfermedades de la vacuna. La vacuna se administra en forma de inyección. Como cualquier vacuna, no ofrece 100% de protección contra las

enfermedades.

Acabo de recibir la vacuna Tdap, ¿cuánto tiempo debo esperar hasta que me quedo embarazada?

No hay período de espera recomendado ya que la vacuna Tdap se puede administrar en cualquier momento durante el embarazo.

¿Puedo recibir la vacuna Tdap mientras estoy embarazada?

Sí. Vacunas que no son infecciosas no han demostrado que causa defectos de nacimiento o problemas en el embarazo. La vacuna contra la difteria y el tétanos tienen una larga historia de uso durante el embarazo sin mayor riesgo. Varios estudios sobre la vacuna contra la tos ferina se han hecho y ofrecen información tranquilizadora. El fabricante de Adacel® ha analizado los resultados de 95 mujeres que recibieron la vacuna Tdap antes o durante el embarazo. Se informó de ningún incremento en los defectos de nacimiento u otros problemas. Además, después de ver a 270 mujeres que recibieron la vacuna durante el embarazo y que no aumenta el riesgo de aborto involuntario, parto prematuro, muerte fetal o un patrón de defectos de nacimiento fue encontrada. Estudios más amplios continúan.

He oído que ahora se recomienda recibir la vacuna Tdap durante la última etapa del embarazo. ¿Qué ha cambiado?

En el pasado, Tdap no se recomendaría durante el embarazo porque la tos ferina no era común en los adultos, pero esto ya no es el caso. Ahora se recomienda que las mujeres embarazadas reciban la vacuna, si es posible, durante el tercer trimestre del embarazo (entre las semanas 27 a 36). Sin embargo, se puede dar en cualquier momento durante el embarazo. Al recibir el tiro en el tercer trimestre se sugiere que el bebé pueda obtener la mayor cantidad de los anticuerpos posible. Estos anticuerpos deberían proporcionar cierta protección contra la tos ferina antes de que el bebé puede recibir su / sus propias vacunas.

Si la madre, el padre, los miembros del hogar y otros cuidadores adultos reciben la vacuna, también puede reducirá la probabilidad de que el bebé está expuesto a la tos ferina.

Tuve Tdap en mi último embarazo. ¿Lo necesito otra vez?

Sí, se recomienda obtener la vacuna Tdap en cada embarazo.

¿Puedo recibir la vacuna Tdap durante la lactancia?

Sí. Vacunas no infecciosas como Tdap son compatibles con la lactancia. Si usted recibe la vacuna durante la lactancia, puede ayudar a prevenir que se enferme y pasar la enfermedad a su bebé. Asegúrese de hablar sobre sus opciones para la lactancia con su proveedor de atención médica, así como el pediatra del bebé.

¿Qué pasa si el padre del bebé recibió la vacuna Tdap en la época en que me quedé embarazada?

No hay pruebas de que las vacunas afectarán esperma y vacunas que se administran a los hombres no reciben al bebé en desarrollo. La vacunación del padre ayudará a proteger al recién nacido contra la infección. Por lo general, la exposición del padre es muy poco probable que aumente los riesgos al embarazo. Para más información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby?Exposiciones Paternas y el Embarazo en <http://www.mothersbaby.org/files/paternal.pdf>.

Las referencias disponibles bajo solicitud.

MotherToBaby al presente está realizando el Proyecto de la Vacuna contra la Tosferina en el Embarazo: Un Proyecto del Registro de Exposiciones y Enfermedades en el Embarazo de OTIS. El propósito de este estudio es aprender más sobre el uso durante en el embarazo de las vacunas contra la tosferina. Si usted está embarazada y ha recibido la vacuna contra la tosferina (TDAP / DTAP), y está interesada en aprender más sobre este estudio, por favor póngase en contacto con el Centro de Coordinación al: 1- 877- 311-8972.

agosto, 2015