

Amoxicilina y el Clavulanato

Esta hoja habla sobre la exposición a la amoxicilina y el clavulanato en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.

¿Qué es la amoxicilina/clavulanato (amox/clav)?

Esta combinación de medicamentos es un antibiótico utilizado para tratar una variedad de infecciones bacterianas. Es una combinación de la amoxicilina, un antibiótico como la penicilina y el clavulanato, una droga que aumenta la efectividad de la amoxicilina. Los nombres de marca comerciales incluyen Amoclav®, Augmentin XR® y Clavamox®.

¿Hay un aumento de riesgo de aborto espontáneo si tomo amoxicilina/clavulanato durante el primer trimestre?

Cuando las dosis recomendadas son tomadas, amox/clav es poco probable que aumente la posibilidad de aborto espontáneo.

¿Hay un aumento posible de malformaciones congénitas si tomo amox/clav durante el primer trimestre?

En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones congénitas. Esto es llamado su riesgo imprevisible. La mayoría de los estudios no han encontrado un aumento posible de malformaciones congénitas cuando amox/clav es tomada durante el primer trimestre; sin embargo, hay muy pocos estudios disponibles. Hay más estudios investigando el uso de la amoxicilina en sí durante el embarazo. Algunos estudios han demostrado un aumento de riesgo de fisura labial (apertura en el labio) con o sin paladar hendido (apertura en el cielo de la boca) cuando se toma la amoxicilina durante el primer trimestre, mientras que otros estudios no han apoyado este aumento de probabilidad. Basándose en la información actual, el riesgo general de una hendidura se considera bajo si se toma amox/clav.

¿Hay un aumento de posibilidad de otras complicaciones del embarazo si tomo amox/clav en el segundo o tercer trimestre?

Hay información limitada en relación al uso de amox/clav durante el segundo trimestre, pero los estudios hasta el momento no informan un aumento de probabilidad de otros problemas del embarazo cuando es usado en esta etapa.

Para su uso en el tercer trimestre, hay un gran estudio de mujeres que tenían un aumento de riesgo de parto prematuro, una condición en la que una mujer comienza las primeras etapas del parto antes de las 37 semanas de embarazo. Las mujeres quienes fueron tratadas con amox/clav tenían una pequeña posibilidad de desarrollar una infección bacteriana grave conocida como enterocolitis necrotizante (ECN) en sus recién nacidos. Esta es una condición que puede lesionar los intestinos del bebé. Revisión adicional ha encontrado algunos estudios que confirman esta posibilidad y otros que no. En general, la probabilidad de que el uso de amox/clav aumenta el riesgo de ECN es poco probable. Sin embargo, debido a esta preocupación, ha sido recomendado que amox/clav no sea usado en mujeres que están en riesgo de parto prematuro.

¿Tomando amox / clavul durante el embarazo afectará el comportamiento de mi bebé o causará problemas de aprendizaje?

Un estudio que ha seguido a cientos de niños hasta los 11 años no encontró que la exposición prenatal a amox / clavol estaba relacionada con problemas de aprendizaje o de conducta.

¿Puedo tomar la amox/clav si estoy amamantando?

Sí. La amox/clav entra en la leche materna, sin embargo, basándose en un pequeño número de estudios; no ha sido demostrado que puede causar problemas para el bebé. Un estudio de 67 madres que tomaron este producto encontró que no había efectos adversos graves en los lactantes. Mientras que algunos bebés tuvieron una posible reacción alérgica, tales como erupción cutánea, diarrea, irritabilidad y estreñimiento, las reacciones no duraron mucho tiempo. Si cree que su bebé ha desarrollado un efecto secundario de los medicamentos que podrían estar en su leche, hable con el proveedor de salud de su hijo. Hable con su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

¿Qué hay si el padre del bebé toma la amox/clav?

No hay estudios examinando los riesgos posibles a un embarazo cuando el padre toma la amox/clav. En general, las exposiciones que el padre tiene son poco probable que aumenten el riesgo a un embarazo. Para más información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby sobre [Las exposiciones paternas y el embarazo](http://mtborguat.wpengine.com/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/) en <http://mtborguat.wpengine.com/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/>.

Por favor haga clic [aquí](#) para las referencias.

[¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en MotherToBaby.org](#)

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, junio 5, 2019.