

Baclofen

Esta hoja trata sobre la exposición al baclofeno en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no debe tomar el lugar de atención médica y el consejo de su proveedor de atención médica.

¿Qué es el baclofeno?

El baclofeno es un medicamento que se ha utilizado para ayudar a relajar ciertos músculos del cuerpo. Se ha utilizado para tratar espasmos, calambres y rigidez de los músculos causados por problemas médicos como la esclerosis múltiple o algunas lesiones de la columna. El baclofeno también se puede usar para tratar ciertos casos de hipo, autismo y trastorno por consumo de alcohol. Se puede tomar por vía oral (vía oral), administrado directamente al líquido que rodea la médula espinal mediante una bomba (bomba intratecal), o usado en la piel (tópicamente). Algunas marcas de baclofeno son Lioresal®, Kemstro® y Gablofen®. El baclofeno tópico se vende bajo la marca EnorvaRX-Baclofen®.

En ocasiones, cuando las personas descubren que están embarazadas, piensan en cambiar la forma de tomar sus medicamentos o dejar de tomarlos por completo. Sin embargo, es importante hablar con sus proveedores de atención de salud antes de realizar cambios en la forma en que toma este medicamento. Si toma baclofeno regularmente y luego deja de tomarlo repentinamente, podría tener síntomas de abstinencia. Los posibles síntomas incluyen convulsiones, alucinaciones, confusión, delirios, desorientación, agitación general, insomnio, mareos, náuseas y cambios de personalidad. No se sabe si o cómo estos síntomas pueden afectar un embarazo. Sus proveedores de atención de salud pueden hablar con usted sobre los beneficios de tratar su afección y los riesgos de una enfermedad no tratada durante el embarazo.

Tomo baclofeno. ¿Puede hacer que me resulte más difícil quedar embarazada?

No se sabe si el baclofeno puede dificultar el embarazo.

¿Tomar baclofeno aumenta la probabilidad de aborto espontáneo?

El aborto espontáneo es común y puede ocurrir en cualquier embarazo por muchas razones diferentes. No se han realizado estudios para comprobar si el baclofeno aumenta la probabilidad de aborto espontáneo.

¿Tomar baclofeno aumenta la posibilidad de defectos de nacimiento?

Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto se conoce como riesgo de fondo. Según los estudios revisados, se desconoce si el baclofeno aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. Hay varios informes de casos de niños que estuvieron expuestos al baclofeno durante el embarazo y no tuvieron defectos de nacimiento.

¿Tomar baclofeno durante el embarazo aumenta la probabilidad de sufrir otros problemas relacionados con el embarazo?

No se han realizado estudios para determinar si el baclofeno aumenta la probabilidad de problemas relacionados con el embarazo, como parto prematuro (nacimiento antes de la semana 37) o bajo peso al nacer (pesar menos de 5 libras y 8 onzas [2500 gramos] al nacer).

Necesito tomar baclofeno durante todo mi embarazo. ¿Causará síntomas de abstinencia en mi bebé después del nacimiento?

El uso de baclofeno por vía oral durante el embarazo pueda causar síntomas temporales en los recién nacidos poco después del nacimiento. Estos síntomas a veces se denominan abstinencia. Los síntomas pueden incluir convulsiones, temblores, rigidez (rigidez de los músculos), somnolencia (demasiado sueño), pupilas dilatadas, boca seca y problemas para alimentarse. No todos los bebés expuestos al baclofeno tendrán estos síntomas. Es importante que sus proveedores de atención médica sepan que está tomando baclofeno para que, si se presentan síntomas, su bebé pueda recibir la atención que sea mejor para él. No se han informado síntomas de abstinencia en bebés cuyas madres fueron tratadas con baclofeno mediante bomba intratecal.

¿Tomar baclofeno durante el embarazo afecta el comportamiento o aprendizaje futuro del niño?

No se han realizado estudios para determinar si el baclofeno puede causar problemas de comportamiento o aprendizaje en el niño.

Lactancia materna mientras toma baclofeno:

La información sobre el uso de baclofeno durante la lactancia es limitada. Un estudio encontró que cantidades muy bajas de baclofeno pasan a la leche materna cuando el baclofeno se toma por vía oral. Cuando el baclofeno se usa por vía tópica o mediante bomba intratecal, se espera que incluso menos medicamento pase a la leche materna. No se han informado efectos nocivos en lactantes.

Si sospecha que el bebé tiene algún síntoma (somnolencia, boca seca, temblores, rigidez o pupilas dilatadas), comuníquese con el proveedor de atención médica del niño. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

Si un hombre toma una baclofeno, ¿podría afectar la fertilidad (capacidad de embarazar a su pareja) o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento?

No se han realizado estudios para determinar si el baclofeno podría afectar la fertilidad masculina o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. En general, es poco probable que las exposiciones de padres o donantes de esperma aumenten los riesgos del embarazo. Para obtener más información, lea la hoja informativa de MotherToBaby sobre las exposiciones paternas en <https://mothertobaby.org/fact-sheets/paternal-exposures-pregnancy/>.

Haga clic aquí para acceder a las referencias.

¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://mothertobaby.org) .

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). *OTIS/MotherToBaby fomenta el lenguaje inclusivo y centrado en la persona. Si bien nuestro nombre todavía contiene una referencia a las madres, estamos actualizando nuestros recursos con términos más inclusivos. El uso del término madre o materna se refiere a una persona que está embarazada. El uso del término padre o paterno se refiere a una persona que contribuye esperma.* Copyright de OTIS, noviembre 1, 2022.