

Benzocaína

Esta hoja habla sobre la exposición a benzocaína en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.

¿Qué es benzocaína?

La benzocaína es un anestésico local tópico. Los anestésicos locales se utilizan para adormecer áreas del cuerpo durante cortos períodos de tiempo. Benzocaína se puede encontrar en algunos productos de venta sin receta médica para aliviar el dolor.

Es probable que muy poco de benzocaína se absorba a través de la piel. Dado que tan poco del medicamento pasa al cuerpo, es probable que la cantidad que llegaría a un bebé en desarrollo, si la hubiera, sea muy poca.

¿Puede benzocaína hacerlo más difícil embarazarme?

No se han hecho estudios para ver si benzocaína puede hacerlo más difícil para una mujer embarazarse.

¿Tomar benzocaína aumenta la posibilidad de aborto espontáneo?

El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. No se han hecho estudios para ver si benzocaína aumenta la posibilidad de aborto espontáneo.

¿Tomar benzocaína en el primer trimestre aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?

En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de posibilidades de tener un bebé con un defecto de nacimiento. Esto es llamado su riesgo imprevisible. Dos informes no encontraron una mayor probabilidad de defectos de nacimiento entre 73 niños cuyas madres informaron haber usado benzocaína en el primer trimestre del embarazo.

Dado que se espera que se absorba muy poca benzocaína a través de la piel, es poco probable que una cantidad significativa siquiera llegue al bebé. Aunque no hay una gran cantidad de buenos datos de investigación, el uso tópico de este medicamento significa que es poco probable que veríamos una mayor probabilidad de defectos de nacimiento si se utiliza de la manera indicada.

¿Tomar benzocaína en el segundo o tercer trimestre podría causar otras complicaciones del embarazo?

Esto se desconoce debido a que benzocaína no ha sido bien estudiada para su uso durante el embarazo.

¿La exposición a benzocaína en el embarazo causará problemas a largo plazo en el comportamiento o el aprendizaje del bebé?

Esto se desconoce debido a que benzocaína no ha sido bien estudiada con relación a resultados a largo plazo.

¿Puedo amamantar mientras tomo benzocaína?

Benzocaína no ha sido bien estudiada para su uso durante la lactancia. Sin embargo, con tal de que la benzocaína no se aplique en la mama o el pezón donde un niño lactante pudiera tenerla en la boca, debería estar bien continuar amamantando. Lávese bien las manos después de usar benzocaína. Hable con sus proveedores de salud sobre todas sus preguntas sobre la lactancia materna.

¿Si un hombre toma benzocaína, podría afectar su fertilidad (capacidad de embarazar a su pareja) o aumentar la posibilidad de defectos de nacimiento?

Esto no ha sido bien estudiado. En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de Exposiciones Paternas en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/>.

Referencias Seleccionadas:

- Berkovitch M, et al. 2002. Sore throat treatment during pregnancy: a prospective, controlled, pilot study. Clin Drug Invest 22(2):135-139.

- Heinonen OP, et al. 1077. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publ Sci Group, Inc, Littleton, MA, 1977.

¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://www.MotherToBaby.org) .

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, julio 31, 2020.