

Dextroanfetamina

Esta hoja trata sobre la exposición a la dextroanfetamina en el embarazo y durante la lactancia. Esta información se basa en la literatura publicada disponible. No debe usarse como un sustituto de la atención médica o los consejos de su proveedor de atención de salud.

¿Qué es la dextroanfetamina?

La dextroanfetamina o d-anfetamina es un medicamento recetado que se usa para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia (somnia diurna extrema). También se ha recetado para el tratamiento de algunos problemas de salud mental. Algunas marcas son Dexedrine®, Dexedrine Spansules®, Dextrostat®, Liquadd®, ProCentra® y Zenzedi®.

La lisdexanfetamina (Vyvanse®) es un medicamento que se ha utilizado para tratar el TDAH y el trastorno por atracones. En el cuerpo, la lisdexanfetamina se descompone en dextroanfetamina. La información sobre la dextroanfetamina durante el embarazo se puede utilizar para ayudar a comprender los posibles efectos de la lisdexanfetamina.

La dextroanfetamina se puede combinar con la anfetamina para hacer Adderall®. Para obtener más información sobre Adderall®, consulte nuestra hoja informativa en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/dextroamphetamine-amphetamine-adderall-2/>.

En ocasiones, cuando las mujeres descubren que están embarazadas, piensan en cambiar la forma de tomar sus medicamentos o dejar de tomarlos por completo. Sin embargo, es importante hablar con sus proveedores de atención médica antes de realizar cambios en la forma en que toma sus medicamentos. Sus proveedores de atención de salud pueden hablar con usted sobre los beneficios de tratar su afección y los riesgos de una enfermedad no tratada durante el embarazo.

Tomo dextroanfetamina. ¿Puede hacer que me resulte más difícil quedar embarazada?

Se desconoce si la dextroanfetamina puede dificultar el embarazo.

¿Tomar dextroanfetamina aumenta la probabilidad de aborto espontáneo?

El aborto espontáneo es común y puede ocurrir en cualquier embarazo por muchas razones diferentes. No se han realizado estudios para comprobar si la dextroanfetamina podría aumentar la probabilidad de aborto espontáneo.

¿Tomar dextroanfetamina aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?

Los defectos de nacimiento pueden ocurrir en cualquier embarazo por diferentes razones. De todos los bebés que nacen cada año, aproximadamente 3 de cada 100 (3 %) tendrán un defecto de nacimiento. Analizamos estudios de investigación para intentar comprender si una exposición, como la dextroanfetamina, podría aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento en un embarazo. Cuando la dextroanfetamina se usa según lo prescrito por razones médicas, no parece aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento.

¿Tomar dextroanfetamina durante el embarazo aumenta la probabilidad de sufrir otros problemas relacionados con el embarazo?

Un estudio anterior informó un menor peso al nacer entre las mujeres que usaron dextroanfetamina prescrita en el 3^{er} trimestre del embarazo para controlar el aumento de peso. Otros estudios que analizaron el uso de dextroanfetamina con anfetamina para tratar el TDAH no encontraron un efecto sobre el peso al nacer.

Las investigaciones muestran que el uso indebido de anfetaminas (usar más de lo recetado o sin receta) puede aumentar las probabilidades de tener un crecimiento deficiente (bebés que nacen pequeños o con un tamaño de cabeza pequeño), un bajo peso al nacer (peso inferior a 5 libras y 8 onzas [2500 gramos] al nacer) y un parto prematuro (nacimiento antes de la semana 37). Las embarazadas de estos estudios podrían haber tenido otros factores de riesgo para estos problemas, como la exposición al alcohol y al cigarrillo, o no haber recibido atención prenatal.

Necesito tomar dextroanfetamina durante todo mi embarazo. ¿Causará síntomas de abstinencia en mi bebé después del nacimiento?

El uso indebido de otras anfetaminas (como la metanfetamina) durante el embarazo puede provocar síntomas temporales en los recién nacidos poco después del nacimiento. Estos síntomas a veces se denominan abstinencia. Pueden incluir nerviosismo, somnolencia y dificultad para respirar en el momento del nacimiento. No se han reportado estos síntomas en recién nacidos de mujeres que toman dextroanfetamina según lo prescrito por sus proveedores de atención médica.

¿Tomar dextroanfetamina durante el embarazo afecta el comportamiento o el aprendizaje futuro del niño?

No se han realizado estudios para determinar si la dextroanfetamina puede aumentar la probabilidad de sufrir problemas de comportamiento o aprendizaje en el niño.

Lactancia al mismo tiempo que se toma dextroanfetamina:

Cuando la dextroanfetamina se toma según las indicaciones, pasa a la leche materna en niveles bajos. Se puede monitorear a los niños para detectar cualquier síntoma relacionado con la exposición a la dextroanfetamina a través de la leche materna. Un pequeño estudio de 4 bebés que fueron amamantados por mujeres que tomaban dextroanfetamina para el TDAH no encontró problemas en la salud y el crecimiento de esos lactantes hasta los 6 a 10 meses de edad. Si sospecha que el bebé tiene algún síntoma (como disminución del apetito, insomnio o irritabilidad), comuníquese con el proveedor de atención médica del niño.

Las etiquetas de algunos productos que contienen dextroanfetamina recomiendan que las mujeres que están amamantando no utilicen estos medicamentos. Pero el beneficio de usar dextroanfetamina y los beneficios de amamantar a su hijo pueden superar los posibles riesgos. Sus proveedores de atención médica pueden hablar con usted sobre el uso de dextroanfetamina y cuál es el mejor tratamiento para usted. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

Si un hombre toma dextroanfetamina, ¿podría afectar la fertilidad o aumentar el riesgo de defectos de nacimiento?

No se han realizado estudios para ver si la dextroanfetamina podría afectar la fertilidad de un hombre (capacidad de dejar embarazada a una mujer) o aumentar las probabilidades de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. En general, es poco probable que las exposiciones de los hombres aumenten los riesgos del embarazo. Para obtener más información, lea la hoja informativa de MotherToBaby sobre las exposiciones paternas en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/exposiciones-paternas/>.

Haga clic aquí para acceder a las referencias.

[¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en MotherToBaby.org .](#)

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, noviembre 1, 2024.