Salmeterol (Serevent Diskus®)

Esta hoja trata del uso del salmeterol en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no debe usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de atención de salud.

¿Qué es el salmeterol?

El salmeterol es un medicamento que se ha utilizado para el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC en español, COPD en inglés). Pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas-beta2. Los agonistas-beta2 ayudan a abrir las vías respiratorias en los pulmones (broncodilatores). Salmeterol es un agonista-beta2 de acción prolongada tomado por respirarlo en los pulmones (inhalación). Se utiliza en combinación con un corticosteroide para el tratamiento del asma. Para información sobre los corticosteroides inhalados, vea la hoja informativa de MotherToBaby https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/los-corticosteroides-inhalados-icss/.

A veces, cuando las personas se enteran de que están embarazadas, piensan en cambiar la forma en que toman sus medicamentos, o suspenderlos por completo. Sin embargo, es importante hablar con sus proveedores de atención de salud antes de hacer cualquier cambio en la forma en que toma este medicamento. Sus proveedores de atención de salud pueden hablar con usted sobre los beneficios de tratar su afección y los riesgos de enfermedad no tratada durante el embarazo.

El salmeterol ha sido considerado un medicamento preferido si se necesita un tratamiento de agonista beta de acción prolongada durante el embarazo. Si el asma de la persona estuvo bien controlada con salmeterol antes del embarazo, podría ser recomendado que continúe usándolo durante el embarazo.

Tomo salmeterol. ¿Puede hacer que sea más difícil embarazarme?

No se sabe si el salmeterol podría dificultar el embarazo.

¿Tomar salmeterol aumenta la posibilidad de aborto espontáneo?

El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. No se han realizado estudios para ver si el salmeterol aumenta la posibilidad de aborto espontáneo. No hay reportes que sugieren un aumento de probabilidad de aborto espontaneo cuando se toma salmeterol durante el embarazo.

¿Tomar salmeterol aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?

Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto es llamado el riesgo imprevisible. Un pequeño número de estudios no sugieren un aumento en la posibilidad de defectos de nacimiento con el uso de salmeterol inhalado durante el embarazo. Cuando el salmeterol es inhalado, muy poco del medicamento entra en la sangre. Se espera que aún menos del medicamento llega al bebé.

¿Tomar salmeterol aumenta la probabilidad de otros problemas relacionados con el embarazo?

Basado en los estudios revisados, no se espera que el uso de salmeterol durante el embarazo aumente la posibilidad de complicaciones del embarazo. Pequeños estudios no han sugerido índices más altos de partos prematuros (bebés que nacen antes de las 37 semanas del embarazo) o bajo peso al nacer (que pesa menos de 5 libras, 8 onzas [2500 gramos] al nacer). Sin embargo, el asma que no está bien controlada puede aumentar la posibilidad de complicaciones del embarazo. Para más información sobre el asma, vea la hoja informativa de MotherToBaby https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/asma-embarazo/.

¿Tomar salmeterol en el embarazo afecta el futuro comportamiento o aprendizaje para el niño?

No se han realizado estudios para ver si salmeterol puede causar problemas en el comportamiento o aprendizaje para el niño. No hay informes de una mayor probabilidad de problemas de futuro aprendizaje o comportamiento en personas que estuvieron expuestas al salmeterol durante el embarazo.

La lactancia mientras tomar salmeterol:

No se han realizado estudios para analizar el uso de salmeterol en la lactancia. Cuando el salmeterol es inhalado, muy

poco del medicamento pasa a la sangre y no se espera que ingrese en la leche en cantidades grandes. Por lo general el uso de los broncodilatadores inhalados es aceptable durante la lactancia. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre el amamantamiento.

Si un varón toma salmeterol, ¿podría afectar su fertilidad (habilidad de embarazar a su pareja) o aumentar la posibilidad de defectos de nacimiento?

No se han realizado estudios para ver si el salmeterol podría afectar la fertilidad masculina o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. No se espera que altos niveles de medicamento entren en la sangre con el uso de un inhalador de salmeterol, así que no es esperan efectos sobre la fertilidad o el embarazo. En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres o donantes de esperma aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de Exposiciones Paternas en https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/exposiciones-paternas/.

MotherToBaby actualmente está llevando a cabo un estudio para analizar el asma y los medicamentos que se usan para tratar el asma durante el embarazo. Si usted está interesada en saber más acerca de este estudio, por favor llame al: 1-877-311-8972 o visite https://mothertobaby.org/join-study/.

Por favor haga clic aquí para ver las referencias.

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). *OTIS/MotherToBaby fomenta el lenguaje inclusivo y centrado en la persona. Si bien nuestro nombre todavía contiene una referencia a las madres, estamos actualizando nuestros recursos con términos más inclusivos. El uso del término madre o materna se refiere a una persona que está embarazada. El uso del término padre o paterno se refiere a una persona que contribuye esperma.* Copyright de OTIS, octubre 1, 2021.