

# Lurasidona

---

Esta hoja trata sobre la exposición a lurasidona en el embarazo y durante la lactancia. Esta información se basa en la bibliografía publicada disponible. No debe usarse como un sustituto de la atención médica y los consejos de su proveedor de atención de salud.

## **¿Qué es lurasidona?**

Lurasidona es un medicamento que se ha utilizado para tratar la esquizofrenia y la depresión bipolar. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antipsicóticos atípicos. La lurasidona se vende bajo la marca Latuda®.

En ocasiones, cuando las personas descubren que están embarazadas, piensan en cambiar la forma de tomar sus medicamentos o dejar de tomarlos por completo. Sin embargo, es importante hablar con sus proveedores de atención de salud antes de realizar cambios en la forma en que toma sus medicamentos. Sus proveedores de atención de salud pueden hablar con usted sobre los beneficios de tratar su afección y los riesgos de una enfermedad no tratada durante el embarazo.

## **Tomo lurasidona. ¿Puede hacer que me resulte más difícil quedar embarazada?**

No se han realizado estudios en humanos para determinar si tomar lurasidona podría dificultar el embarazo.

## **¿Tomar lurasidona aumenta la probabilidad de aborto espontáneo?**

El aborto espontáneo es común y puede ocurrir en cualquier embarazo por muchas razones diferentes. No se han realizado estudios para comprobar si tomar lurasidona podría aumentar la probabilidad de aborto espontáneo.

## **¿Tomar lurasidona aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?**

Los defectos de nacimiento pueden ocurrir en cualquier embarazo por diferentes razones. De todos los bebés que nacen cada año, aproximadamente 3 de cada 100 (3 %) tendrán un defecto de nacimiento. La información sobre el uso de lurasidona en el embarazo es limitada. Un estudio que analizó a 134 personas que usaron lurasidona durante el embarazo no encontró patrones específicos de defectos de nacimiento en sus bebés. Los datos de estudios en animales no sugieren una mayor probabilidad de defectos de nacimiento.

## **¿Tomar lurasidona durante el embarazo aumenta la probabilidad de sufrir otros problemas relacionados con el embarazo?**

No se han realizado estudios para determinar si el lurasidona aumenta la probabilidad de problemas relacionados con el embarazo, como parto prematuro (nacimiento antes de la semana 37) o bajo peso al nacer (pesar menos de 5 libras y 8 onzas [2500 gramos] al nacer).

## **Necesito tomar lurasidona durante todo mi embarazo. ¿Causará síntomas de abstinencia en mi bebé después del nacimiento?**

El uso de medicamentos antipsicóticos como lurasidona durante el tercer trimestre del embarazo puede provocar síntomas temporales en los recién nacidos poco después del nacimiento. Estos síntomas a veces se denominan abstinencia y pueden incluir movimientos musculares incontrolados, cambios en el tono muscular, exceso de sueño, dificultad para respirar o problemas para alimentarse.

No todos los bebés que están expuestos a medicamentos antipsicóticos durante el embarazo presentarán estos síntomas. Además, no se han reportado estos síntomas con el uso de lurasidona durante el embarazo. Sin embargo, es importante que sus proveedores de atención de salud sepan que está tomando lurasidona para que, si se presentan síntomas, su bebé pueda recibir la atención que sea mejor para él.

## **¿Tomar lurasidona durante el embarazo afecta el comportamiento o el aprendizaje futuro del niño?**

No se han realizado estudios para determinar si la lurasidona puede causar problemas de comportamiento o de aprendizaje en el niño.

***Lactancia mientras toma lurasidona:***

No se ha estudiado el uso de la lurasidona durante la lactancia. Sin embargo, se espera que muy poco del medicamento pase a la leche materna. En un informe de una persona que estaba tomando lurasidona mientras amamantaba, no se informaron efectos secundarios en el niño lactante. Sus proveedores de atención médica pueden hablar con usted sobre el uso de lurasidona y cuál es el mejor tratamiento para usted. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

***Si un hombre toma lurasidona, ¿podría afectar la fertilidad o aumentar el riesgo de defectos de nacimiento?***

No se han realizado estudios en humanos para ver si la lurasidona podría afectar la fertilidad masculina (capacidad de dejar embarazada a su pareja) o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. En general, es poco probable que las exposiciones de padres o donantes de esperma aumenten los riesgos del embarazo. Para obtener más información, lea la hoja informativa de MotherToBaby sobre las exposiciones paternas en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/exposiciones-paternas/>.

Haga clic [aquí](#) para acceder a las referencias.

**¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://mothertobaby.org) .**

---

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, 1 de mayo de 2024.