

Oxcarbazepina (Trileptal® , Oxtellar XR®)

Esta hoja habla sobre la exposición a oxcarbazepina en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.

¿Qué es oxcarbazepina (oxcarbazepine)?

Oxcarbazepina es un medicamento que ha sido aprobado para el tratamiento de convulsiones parciales. También se ha utilizado para tratar la migraña, síntomas de la demencia, y trastorno bipolar. Algunas marcas de oxcarbazepina son Trileptal® y Oxtellar XR®.

Tomo oxcarbazepina. ¿Puede hacerlo más difícil embarazarme?

No se han realizado estudios en personas para ver si oxcarbazepina podría hacerlo más difícil embarazarse. Cuando sea posible, una persona con un trastorno convulsivo o un trastorno de la migraña que podría quedar embarazada debe discutir sus opciones de tratamiento en un embarazo con sus proveedores de salud antes de quedar embarazada. También deben discutir el tomar un suplemento de ácido fólico o vitamina prenatal.

Acabo de enterarme de que estoy embarazada. ¿Debo dejar de tomar oxcarbazepina?

Hable con sus proveedores de salud antes de hacer cualquier cambio a la manera en que toma su(s) medicamento(s). Tener una convulsión durante el embarazo puede ser perjudicial para el embarazo.

¿Tomar oxcarbazepina aumenta la posibilidad de aborto espontáneo?

El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. Un estudio no encontró una mayor tasa de aborto espontáneo entre 262 personas con epilepsia que tomaron oxcarbazepina en comparación con aquellas con epilepsia que tomaron otros medicamentos.

¿Tomar oxcarbazepina aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?

Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto es llamado el riesgo imprevisible. Estudios en animales encontraron que oxcarbazepina podría aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento. Oxcarbazepina no ha sido bien estudiada para su uso durante el embarazo en los humanos. Sin embargo, los informes sobre cerca de 1300 embarazos no han sugerido una probabilidad significativamente mayor de defectos de nacimiento cuando se utilizó oxcarbazepina. La probabilidad de defectos de nacimiento puede aumentar cuando se utilizan otros medicamentos anticonvulsivos además de oxcarbazepina.

¿Tomar oxcarbazepina causa otras complicaciones del embarazo?

Estudios en animales han sugerido que oxcarbazepina podría causar un menor peso al nacer. Un informe humano también encontró bajo peso al nacer en 7 de 8 recién nacidos expuestos a oxcarbazepina en el embarazo. Sin embargo, este informe también encontró que el bajo peso al nacer era más común entre los recién nacidos de mujeres con epilepsia. Así que no está claro si es el medicamento o la condición médica subyacente que podría conducir a un bajo peso al nacer.

En raras ocasiones, el tomar medicamentos anticonvulsivos, incluyendo oxcarbazepina, durante el embarazo puede causar problemas de sangrado en el recién nacido debido a los bajos niveles de vitamina K. Las mujeres que toman oxcarbazepina en el embarazo deben hablar con sus proveedores de salud acerca de tomar suplementos de vitamina K cerca del final de sus embarazos. También pueden hablar con el pediatra de su hijo antes del parto acerca de darle al recién nacido un suplemento de vitamina K al nacer.

Necesito tomar oxcarbazepina durante todo mi embarazo. ¿Causará síntomas de abstinencia en mi bebé después del parto?

Hay 2 informes de casos de recién nacidos que podrían haber tenido abstinencia (síndrome de abstinencia neonatal) de la exposición a oxcarbazepina durante el embarazo. Algunos de los síntomas incluyeron mala alimentación, temblor, irritabilidad, estornudos, y un llanto agudo. Los síntomas desaparecieron después de 9 a 12 días. Dos informes de casos no son suficientes para saber si oxcarbazepina fue la causa de estos síntomas.

¿Tomar oxcarbazepina en el embarazo causa problemas a largo plazo en el comportamiento o el aprendizaje del bebé?

Un estudio entre las mujeres que tomaron medicamentos anticonvulsivos (sólo 10 tomaron oxcarbazepina), encontró alguna habilidad verbal retrasada en bebés evaluados a la edad de 7 meses. No se han realizado otros estudios para ver si el uso de oxcarbazepina en un embarazo podría causar problemas a largo plazo de comportamiento o aprendizaje.

¿Puedo amamantar mientras tomo oxcarbazepina?

Oxcarbazepina pasa a la leche materna. Oxcarbazepina no ha sido bien estudiada para su uso durante la lactancia. Hay informes de casos que describen a niños sanos sin efectos secundarios después de haber estado expuesto a oxcarbazepina a través de la leche materna. Si una persona está amamantando mientras toma oxcarbazepina, el niño lactante debe ser vigilado en busca de signos de somnolencia (muy adormilado o incapaz de despertarse para amamantar) o no aumentar de peso. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud sobre todas sus preguntas sobre la lactancia materna.

Tomo oxcarbazepina. ¿Podría hacerlo más difícil embarazarse a mi pareja o aumentar la posibilidad de defectos de nacimiento?

Las personas que tienen epilepsia pueden tener fertilidad reducida y una calidad de espermatozoides más pobre que las que no tienen epilepsia. Un estudio entre las personas con epilepsia encontró una tasa de natalidad más baja en parejas de hombres tratados con oxcarbazepina en comparación con aquellos que no fueron tratados. Los autores mencionaron que otros factores de estilo de vida debido a tener convulsiones podrían explicar estos resultados. Otro estudio entre 18 hombres que fueron tratados con oxcarbazepina mostró espermatozoides anormales. No está claro si este hallazgo afectó su fertilidad.

En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres o donadores de esperma aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de Exposiciones Paternas en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/>.

Haga clic aquí para ver las referencias.

Registro de Embarazo de Drogas Antiepilépticas de América del Norte (AED): Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman medicamentos antiepilépticos, como la oxcarbazepina. Para más información puede consultar su sitio web:

<http://www.aedpregnancyregistry.org/for-pregnant-women-introduction/>

¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://mothertobaby.org) .

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, octubre 22, 2020.