

# Prucaloprida (Motegrity®)

Esta hoja trata sobre la exposición a prucaloprida en el embarazo y durante la lactancia. Esta información se basa en la literatura publicada disponible. No debe usarse como un sustituto de la atención médica o los consejos de su proveedor de atención de salud.

## **¿Qué es la prucaloprida?**

La prucaloprida es un medicamento que se usa para tratar el estreñimiento funcional (también conocido por estreñimiento crónico idiopático) en adultos. Aquí, crónico significa que los síntomas, como los evacuaciones intestinales infrecuentes y heces duros, han estado ocurriendo durante al menos 6 meses. Idiopática significa que se desconoce la causa. La prucaloprida se vende bajo la marca Motegrity®.

Otras formas de estreñimiento pueden aliviarse con laxantes de venta libre (OTC). Para obtener más información sobre los laxantes de venta libre, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de los laxantes en general en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/laxantes/>.

A veces, cuando las personas se enteran de que están embarazadas, piensan en cambiar la forma de tomar sus medicamentos o suspenderlos por completo. Sin embargo, es importante hablar con sus proveedores de atención de salud antes de hacer cualquier cambio en la forma en que toma su medicamento. Sus proveedores de atención de salud pueden hablar con usted sobre los beneficios de tratar su afección y los riesgos de enfermedad no tratada durante el embarazo.

## **Tomo prucaloprida. ¿Puede hacer que me resulte más difícil quedar embarazada?**

No se han realizado estudios para ver si la prucaloprida puede dificultar el embarazo.

## **¿Tomar prucaloprida aumenta la probabilidad de aborto espontáneo?**

El aborto espontáneo es común y puede ocurrir en cualquier embarazo por muchas razones diferentes. Se desconoce si la prucaloprida aumenta la probabilidad de aborto espontáneo.

## **¿Tomar prucaloprida aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?**

Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto se conoce como riesgo de fondo. Se desconoce si la prucaloprida aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. No se han realizado estudios en humanos para ver si la prucaloprida aumenta la posibilidad de defectos de nacimiento. Los estudios en animales realizados por el fabricante no mostraron un aumento de los defectos de nacimiento debido a la exposición a prucaloprida.

## **¿Tomar prucaloprida durante el embarazo aumenta la probabilidad de otros problemas relacionados con el embarazo?**

No se han realizado estudios para ver si la prucaloprida aumenta la probabilidad de problemas relacionados con el embarazo, como parto prematuro (parto antes de la semana 37) o bajo peso al nacer (que pesa menos de 5 libras, 8 onzas [2500 gramos] al nacer).

## **¿Tomar prucaloprida durante el embarazo afecta el comportamiento o aprendizaje futuro para el niño?**

No se han realizado estudios para ver si la prucaloprida puede causar problemas en el comportamiento o aprendizaje para el niño.

## **La lactancia mientras se toma prucaloprida:**

No se han publicado estudios que analicen el uso de prucaloprida durante la lactancia. El fabricante informa de un estudio no publicado que indica que una cantidad relativamente baja de prucaloprida pasa a la leche. Si sospecha que el bebé tiene algún síntoma (como diarrea), comuníquese con el proveedor de atención de salud del niño. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

## **Si un varón toma prucaloprida, ¿podría afectar la fertilidad o aumentar la probabilidad de defectos de**

### **nacimiento?**

No se han realizado estudios para ver si la prucaloprida podría afectar la fertilidad masculina (capacidad de embarazar a la pareja) o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres o donantes de esperma aumenten los riesgos de un embarazo. Para más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de Exposiciones Paternas en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/exposiciones-paternas/>.

*MotherToBaby está llevando a cabo un estudio que analiza el estreñimiento funcional y los medicamentos utilizados para tratarlo en el embarazo. Si está interesado en obtener más información sobre este estudio, llame al 1-877-311-8972 o visite <https://mothertobaby.org/es/unirse-a-un-estudio/>.*

**Por favor haga clic aquí para ver las referencias.**

**¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://mothertobaby.org) .**

---

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, mayo 1, 2023.