

Succinato de Doxilamina e Hirdocloruro de Piridoxina (Diclegis® | Diclectin®)

En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si la combinación del succinato de doxilamina y el hidrocloreuro de piridoxina podría aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.

¿Qué es el succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina?

El succinato de doxilamina es un medicamento que ha sido usado como un antihistamínico y como una ayuda para dormir. Los antihistamínicos disminuyen los síntomas de las reacciones alérgicas, el insomnio (inhabilidad para dormir) y los resfríos. El hidrocloreuro de piridoxina es una forma de vitamina B6.

La combinación de 10mg de succinato de doxilamina y 10mg de hidrocloreuro de piridoxina es un medicamento usado para tratar las náuseas y los vómitos del embarazo (náuseas del embarazo), también llamada “enfermedad matutina.” Para obtener más información sobre las náuseas del embarazo, vea la hoja informativa de MotherToBaby [Las náuseas y los vómitos durante el embarazo](https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/nauseas-del-embarazo/pdf/) en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/nauseas-del-embarazo/pdf/>.

En los Estados Unidos, la combinación de doxilamina y la piridoxina han sido vendidas bajo el nombre de Diclegis® desde 2013. Hace muchos años, era vendido bajo el nombre de Bendectin®. En Canadá, ha sido vendido bajo la marca Diclectin® desde 1979.

Diclegis® y Diclectin® son tabletas de liberación lenta disponibles por receta médica. La liberación lenta significa que la capa de la tableta previene que los ingredientes sean absorbidos muy rápidamente por el cuerpo. Por esta razón, es importante tomar el medicamento y seguir un horario establecido (no sólo cuando se necesite) para poder obtener el mayor beneficio. El succinato de doxilamina y/o el hidrocloreuro de piridoxina debería también estar disponible como medicina de venta libre (OTC por sus siglas en inglés).

¿El fabricante suspendió de hacer el Bendectin® porque era inseguro?

No. Bendectin® fue usado por más de 33 millones de mujeres en todo el mundo desde 1956 cuando fue aprobado primero por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos hasta 1983. En los 1970s, demandas se archivaron en contra del fabricante se clamaron que el uso de Bendectin® en el embarazo causo que los bebés nacieran con malformaciones congénitas. Sin embargo, la evidencia científica no apoyó estos reclamos. En 1983, la producción de Bendectin® fue suspendida por un aumento de los costos de estas demandas. La Administración de Alimentos y Drogas emitió un comunicado en 1983 y de nuevo en 1999 enfatizando en que la retirada de su producción no estaba relacionada a la seguridad. En 2013 la Administración de Alimentos y Drogas clasificó que Diclegis® no pone en riesgo al feto y aprobó el uso de Diclegis® para el tratamiento de las náuseas del embarazo.

¿Está bien el usar el succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina durante el embarazo?

Sí. El succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina es bien estudiado en su uso para tratar las náuseas del embarazo. Estudios totalizando cientos de miles de mujeres embarazadas expuestas a la medicina no han encontrado un aumento con su uso durante el embarazo o que aumentara la probabilidad de malformaciones congénitas u otros resultados adversos del embarazo. La combinación del succinato de doxilamina y el hidrocloreuro de piridoxina es recomendado actualmente como un tratamiento principal por el Congreso americano de obstetras y ginecólogos (ACOG por sus siglas en inglés) y por varias organizaciones médicas en Canadá. En adición, manteniendo sus náuseas bajo control podría ayudar a mantenerse fuera del hospital por la deshidratación causada por los vómitos.

¿Qué pasa si yo necesito tomar más que la dosis estándar del succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina?

Los investigadores han examinado el uso del succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina en el embarazo

cuando las mujeres les prescribieron más dosis de lo regular debido a la severidad de sus síntomas y/o el peso de sus cuerpos. No hubo aumento en el número de resultados adversos del embarazo para esos quienes usaron más alta dosis recetado por su proveedor de salud curando comparado a esos quienes usaron la dosis estándar. Siempre debe hablar con su proveedor de salud antes de hacer algunos cambios en sus medicamentos.

¿Podría este medicamento causar efectos de largo plazo en mis niños si lo tomo durante el embarazo?

Los estudios que se han llevado en niños desde las edades de dos a siete años no encontraron un riesgo más alto de problemas asociadas con el succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina cuando usado por sus madres durante el embarazo.

¿Puedo tomar el succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina durante la lactancia?

No hay estudios formales investigando a los efectos de la combinación del succinato de doxilamina y el hidrocloreuro de piridoxina en el bebé amamantado. Los antihistamínicos que pueden marear a la madre puede causar somnolencia en un infante amamantado, especialmente cuando es usado en una base regular. El hidrocloreuro de piridoxina es excretado en la leche materna pero no ha sido asociado con ningún problema en los bebés amamantados. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

¿Qué hay si el padre del bebé toma el succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina?

No hay estudios que han investigado los posibles riesgos a un embarazo cuando el padre toma el succinato de doxilamina - el hidrocloreuro de piridoxina. Por lo general, las exposiciones que tienen los padres son menos posible que aumenten los riesgos a un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby [Las exposiciones paternas y el embarazo](https://mtborguat.wpengine.com/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/) en <https://mtborguat.wpengine.com/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/>.

Por favor haga clic [aquí](#) para las referencias.

¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en MotherToBaby.org .

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, junio 5, 2019.