

Vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 (Novavax)

Esta hoja trata de la exposición a la vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 (Novavax) en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no debe usarse como un sustituto de la atención médica o los consejos de su proveedor de atención de salud.

¿Qué es el COVID-19?

COVID-19 (forma breve para decir **Coronavirus Disease 2019** en inglés) es una enfermedad causada por un virus (llamado SARS-CoV-2). El virus se propaga fácilmente de persona a persona a través de gotas respiratorias que provienen de la boca y narices cuando respiramos, hablamos, tosamos, o estornudamos. Para obtener más información sobre COVID-19, consulte la hoja informativa de MotherToBaby en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/covid-19/>.

¿Qué es una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19?

Las vacunas con subunidades de proteínas contra COVID-19 ayudan a proteger contra el virus que causa COVID-19. Una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 está aprobada para su uso en los Estados Unidos, fabricada por Novavax. Las vacunas con subunidades de proteínas no contienen virus vivo que podría causar enfermedad de COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades tienen más información acerca de las vacunas con subunidades de proteínas aquí:

<https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/proteinsubunit.html>. La vacuna con subunidades de proteínas de Novavax no es 100% efectiva para prevenir COVID-19, pero puede bajar grandemente la probabilidad de enfermarse gravemente por el virus.

Hable con su proveedor de atención de salud, contacte a un especialista de MotherToBaby, o visite el sitio de CDC para obtener información sobre cómo mantenerse al día con la vacuna COVID-19:

<https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html>. Para obtener más información sobre las vacunas de ARNm contra COVID-19, consulte la hoja informativa de MotherToBaby en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/vacuna-de-arnm-contra-covid-19/>.

¿Es recomendado que las personas embarazadas reciben vacunas con subunidades de proteínas contra COVID-19?

Organizaciones que incluyen CDC, la Academia Americana de Pediatría, y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan que las personas que están embarazadas, recientemente embarazadas, planeando un embarazo, o que pueden quedar embarazadas en el futuro estén al día con las vacunas contra COVID-19. La vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 de Novavax se puede administrar en cualquier momento del embarazo.

Contraer una infección de COVID-19 durante el embarazo aumenta la probabilidad de enfermedad grave y complicaciones del embarazo. Los estudios han demostrado que las personas que se vacunan tienen menos probabilidades de contraer COVID-19. Si contraen COVID-19, es menos probable que se enfermen gravemente.

¿Recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 hace que sea más difícil embarazarse?

Las vacunas con subunidades de proteínas contra COVID-19 no se han estudiado para ver si pueden dificultar el embarazo. Sin embargo, no hay evidencia ninguna de que cualquier vacuna cause problemas para la fertilidad. La Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva recomienda que las personas sometándose al tratamiento de fertilidad se mantengan al día con las vacunas contra COVID-19.

Acabo de recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19. ¿Cuánto tiempo debo esperar antes de quedar embarazada?

No hay espera recomendada para quedar embarazada después de recibir una vacuna con subunidades de proteínas

contra COVID-19.

¿Recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 aumenta la posibilidad de aborto espontáneo?

El aborto espontáneo es común y puede ocurrir en cualquier embarazo por muchas razones diferentes. No se han realizado estudios en humanos para ver si recibir la vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 de Novavax durante el embarazo aumentaría la posibilidad de aborto espontáneo.

¿Recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?

Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto se conoce como el riesgo de fondo. No se han realizado estudios en humanos para ver si recibir la vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 de Novavax aumentaría la probabilidad de defectos de nacimiento. Los estudios en animales en ratas no mostraron una mayor probabilidad de defectos de nacimiento.

La fiebre es un posible efecto secundario de la vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19. Una fiebre alta en el primer trimestre puede aumentar la probabilidad de ciertos defectos de nacimiento. Por lo general, se recomienda el paracetamol (acetaminofén) para reducir la fiebre durante el embarazo. Para obtener más información sobre la fiebre y el embarazo, consulte la hoja informativa de MotherToBaby en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/la-hipertermia/>.

¿Recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 aumenta la probabilidad de otros problemas relacionados al embarazo?

No se han realizado estudios en humanos para ver si la vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 de Novavax aumentaría la probabilidad de otros problemas relacionados con el embarazo, como el parto prematuro (antes de las 37 semanas de embarazo) o el bajo peso al nacer (que pesa menos de 5 libras, 8 onzas (2500 gramos) al nacer). Los estudios en animales en ratas no informaron otros problemas de embarazo.

¿Recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 en el embarazo afecta el futuro comportamiento o aprendizaje para el niño?

Según lo que se sabe sobre esta y otras vacunas, no se espera que recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 cause problemas a largo plazo para el niño.

¿Recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 durante el embarazo protege al bebé contra el virus después del parto?

No se sabe si recibir una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 durante el embarazo protegería al bebé de COVID-19 después del parto. Los estudios que analizan otro tipo de vacuna contra COVID-19 (vacuna de ARNm) demuestran que los anticuerpos que una persona produce después de recibir la vacuna durante el embarazo pueden pasar al bebé en desarrollo. Se necesita investigación para saber si esto también es cierto para las vacunas con subunidades de proteínas.

La lactancia y las vacunas con subunidades de proteínas contra COVID-19:

No se han realizado estudios para ver si la vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 de Novavax pasa a la leche materna. Sin embargo, debido a que no es una vacuna viva que pueda hacer copias de sí misma (replicarse) y propagarse a través del cuerpo, no se espera que entre en la leche.

Organizaciones que incluyen la Academia de Medicina de la Lactancia Materna y la Academia Americana de Pediatría están de acuerdo de que las personas que están amamantando pueden recibir vacunas contra COVID-19. No hay recomendación para posponer el amamantamiento o desechar la leche después de recibir la vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19 de Novavax. Hable con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre el amamantamiento.

Si un varón recibe una vacuna con subunidades de proteínas contra COVID-19, ¿puede afectar la fertilidad (capacidad para embarazar a la pareja) o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento?

Las vacunas con subunidades de proteínas contra COVID-19 no se han estudiado para ver si pueden afectar la

fertilidad masculina o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento en el embarazo de una pareja. En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres o los donantes de esperma aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de Exposiciones Paternas en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/exposiciones-paternas/>.

MotherToBaby está llevando a cabo un estudio observacional que analiza las vacunas COVID-19 en el embarazo. Si usted nunca se ha vacunado contra el COVID-19, o se vacunó antes de su embarazo, puede ser elegible para participar. Si usted está interesada en participar en este estudio, por favor llame al 1-877-311-8972 o regístrese en <https://mothertobaby.org/join-study/>.

Por favor haga clic [aquí](#) para ver las referencias.

¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en MotherToBaby.org .

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). *OTIS/MotherToBaby fomenta el lenguaje inclusivo y centrado en la persona. Si bien nuestro nombre todavía contiene una referencia a las madres, estamos actualizando nuestros recursos con términos más inclusivos. El uso del término madre o materna se refiere a una persona que está embarazada. El uso del término padre o paterno se refiere a una persona que contribuye esperma.* Copyright de OTIS, mayo 31, 2023.