


متخصصین د میندواری- یا شیدو ورکولو پر مهال د واکسینونو په اړه څه وایي؟

دا انفوگرافیک له MotherToBaby څخه د میندواری- یا ماشوم ته د شیدو ورکولو پر مهال د خطرونو سره د مخ کېدو په اړه کلیدي معلومات لري.


کوویډ-19

ویروس له امله رامنځته کېدونکې ناروغي ده چې خبرو SARS-CoV-2 د کولو، ټوخي یا پرنجې پر مهال په آسانی سره د تنفسي څاڅکو په واسطه له یوه شخص څخه بل ته لېږدول کېږي.



د کوویډ-19 mRNA واکسین:



- مرسته کوي چې د هغه ویروس پر وړاندې خوندي و اوسئ چې د کوویډ-19 لامل کېږي.
- په متحده ایالاتو کې د کوویډ-19 پر وړاندې د خوندیتوب لپاره تر ټولو مشهور کارول کېدونکې واکسین دی.
- هغه ژوندی ویروس نه لري چې د کوویډ-19 لامل کېږي.
- د کوویډ-19 په مخنیوي کې 100 سلنه اغیزناک نه دی، مګر په لویه کچه په سخت ډول د ناروغ کېدو چانس کموي.



Moderna/Spikevax®
Pfizer/Comirnaty®

انفلونزا په عام ډول د والګي په نوم یادېږي.


دا د تنفسي مجرا عفونت دی. په نښو نښانو کې تبه، سردرد، لږزه، د عضلاتو درد، ټوخی، بنده او روانه پوزه، د ستوني درد او ستړیا شامل دي. ځینې وخت والګي د کانګو او نس ناستي لامل کېږي. د هغه ویروس ډولونه چې د فصلي انفلونزا لامل کېږي کیدای شي هر کال بدلون ومومي.



د والګي واکسین یو غیر فعال واکسین دی، په دې معنی چې واکسین د والګي ژوندی ویروس نه لري او نشي کولای په والګي باندې ستاسو د مبتلا کېدو لامل شي. د انفلونزا واکسین هر کال اپډیټ کېږي.

د تنفسي مجرا سلولي ویروس (RSV)


یو ویروس دی چې کیدای شي په تنفسي مجرا کې د عفونت لامل شي. کیدای شي د ټوخي یا پرنجې له لارې او همداراز له هغو سطحو سره د مستقیمې اړیکې په واسطه خپور شي چې دا ویروس لري.



د RSV واکسین

د دې لامل کېږي چې یو شخص د RSV پر وړاندې انټي باډي رامنځته کړي. د میندواری- پر مهال یې سپارښتنه کېږي تر څو د ودې په حال کې ماشوم ته انټي باډي ولېږدول شي. دا انټي باډي کولای شي له ماشوم څخه د RSV د شدید عفونت پر وړاندې د زیږون څخه وروسته تر 6 میاشتو پورې ساتنه وکړي.

Abrysvo® په متحده ایالاتو کې د میندواری- پر مهال د کارولو لپاره د RSV یوازینی تایید شوی واکسین دی، دا د پروتینو د فرعي واحد واکسین دی. ژوندی ویروس نه لري.



تیتانوس یوه بکټریایي ناروغي ده چې په بدن کې د ماهیچو د کلکېدو او د عضلاتو د درد ناګ اسپاسم لامل کېږي.

دیفټیریا یو بکټریایي عفونت دی چې ډیری وخت له تې او د ستوني له درد سره پیل کېږي. کیدای شي د ستوني او هوايي مجراوو په شا کې یوه غشا رامنځته شي او ساه اخیستل ستونزمن کړي.

تور ټوخی یوه بکټریایي ناروغي ده چې معمولاً د یخ وهل کېدو له نښو نښانو سره پیل کېږي.

د تیتانوس او دیفټیریا عفونتونه کیدای شي د یوې میندواری- میرمنې لپاره مرکوبي وي او د جنین د له لاسه ورکولو لامل شي. له وخت وړاندې زیږېدل هم یوه اندېښنه ده.



د Tdap واکسین

د تیتانوس، دیفټیریا او تور ټوخي (Tdap) پر وړاندې ساتنه کوي. Tdap یو غیر عفوني واکسین دی، په دې معنی چې تاسو له واکسین څخه ناروغ کیدای نشئ. په متحده ایالاتو کې د میندواری- پر مهال د کارول کېدو لپاره د Tdap دوه ډوله واکسینونه شته دي: Adacel® او Boostrix®.



MotherToBaby د هېواد یوه مخکښه او د باور وړ اداره ده چې د میندواری- او شیدو ورکولو پر مهال د درملو د خوندیتوب او نورو خطرونو په اړه د شواهدو پر بنسټ معلومات وړاندې کوي. له انګلیسي او اسپانیایي پرته په نورو ژبو باندې د میندواری- پر مهال له خطرونو سره د مخ کېدو اړوند سرچینو لپاره، په مهرباني سره MotherToBaby.org/additional-languages ته مراجعه وکړئ.

