

VACUNAS EN EL EMBARAZO

Los profesionales de salud ofrecen rutinariamente estas vacunas durante el embarazo. Estas vacunas están bien estudiadas y no han mostrado riesgos para el feto.



VACUNA TDAP

CUÁNDO: Entre 27 y 36 semanas de cada embarazo

POR QUÉ: La tos ferina (pertussis) puede ser grave e incluso mortal para bebés pequeños. Recibir la vacuna Tdap en cada embarazo protege al bebé de la tos ferina tras el parto.

VACUNA CONTRA GRIPE


CUÁNDO: Cada año, en cualquier trimestre de embarazo

POR QUÉ: Tener gripe (influenza) durante el embarazo aumenta la probabilidad de enfermedad grave. Esto puede causar problemas en el embarazo, hospitalización e incluso la muerte.

VACUNA CONTRA COVID-19

CUÁNDO: Cada año, en cualquier trimestre de embarazo

POR QUÉ: Tener infección por COVID-19 durante el embarazo aumenta las probabilidades de problemas como parto prematuro, hospitalización, necesidad de un ventilador y la muerte.



VACUNA CONTRA VRS

CUÁNDO: Entre 32 y 36 semanas de embarazo, entre septiembre y enero (a menos que recibieras la vacuna en un embarazo anterior)

POR QUÉ: El VRS puede causar enfermedad grave en los bebés. Recibir la vacuna durante el embarazo protege al bebé tras el parto.

¿LO SABÍAS? Los estudios demuestran que los anticuerpos que produces tras vacunarte durante el embarazo pasan al bebé para protegerlo durante meses después de nacer.



¡PREPÁRATE! Mientras piensas en vacunas durante el embarazo, es un buen momento para pensar también en vacunas para tu bebé. HealthyChildren.org tiene información útil sobre vacunas infantiles.